

Kanapių gaminių rūkymo pasekmės nepilnamečiams

Naujosios Zelandijos mokslininkų priklausomybių nuo kanapių gaminių 1997m. tyrimo duomenys. (Seminaro, vykusio 2001 m. Dubline, Airijos Respublikoje, medžiaga, perduota naudotis visuomeninei organizacijai „Tėvai prieš narkotikus“).

15-16 m. paaugliai, vartoję kanapes 10 ar daugiau kartų, (palyginti su nevartojančiais)

14 kartų dažniau tampa priklausomi nuo kanapių

5 kartus dažniau turi problemų dėl alkoholio vartojimo

16 kartų dažniau yra areštuojami už nusikaltimus, nesusijusius su narkotikais

2 kartus dažniau susergera psichikos ligomis

10 kartų dažniau mėgina nusižudyti

4 kartus dažniau nebaigia mokyklos

4 kartus dažniau išmetami iš darbo

Kanapės ir vėžys

Pacientų, rūkusių kanapių gaminius, stebėjimo duomenys

<u>Pacientai, vartoję kanapes</u>	<u>Lytis</u>	<u>Amžius</u>	<u>Vėžio forma</u>	<u>Pasekmės</u>
1. Kasdien, dideliais kiekiais	Vyr	19	Sinusų	Mirė
2. Kasdien, dideliais kiekiais	Vyr	28	Glandų	Tebėra gyvas
3. 2 suktinės kasdien	Vyr	27	Lūpų	Tebėra gyvas
4. 3-7 suktinės per savaitę*	Vyr	34	Glandų	Tebėra gyvas
5. Dideliais kiekiais	Vyr	20	Gerklės	Tebėra gyvas
6. 1-2 pypkės per dieną*	Vyr	38	Gerklės	Tebėra gyvas
7. Esant progai*	Mot	26	Gerklės	Tebėra gyvas
8. Esant progai *	Vyr	35	Gerklės	Tebėra gyvas
9. 15 metų + Kokainas	Mot	33	Sinusų	Gyvas
10. Dažnai	Vyr	24	Gerklės	Tebėra gyvas
11. Dažnai	Vyr	22	Gerklės	Gyvas

* Nerūkė cigarečių

Pagal *P.J. Donald, Marijuana and upper aerodigestive tract malignancy in young patients*”, 1991. *Marihuana ir viršutinio kvėpavimo bei virškinimo trakto pakenkimai tarp jaunų pacientų*. G. Nahas and C. Latour (eds.), *Physiopathology of Illicit Drugs: Cannabis, Cocaine, Opiates*, 39-54, Oxford, 1991; *Advanced malignancy in the young marihuana smoker*, in H. Friedman et al. (eds.), *Drugs of Abuse Immunity and Immunodeficiency*, 33-36, London, 1991.

Stiprūs sveikatos sutrikimai vartojant kanapes

- Susilpnėję gabumai moksle
- Susilpnėję pojūčiai
- Padidėjusi autoavarijų rizika tiems, kas vairuoja apsvaigęs
- Veikia 24 valandas

Chroniški sveikatos sutrikimai

- Sutrinka atmintis ir dėmesys
- Sutrikimai gali išlikti ir nustojus vartoti
- Priklausomybės nuo kanapių išsivystymas
- Šizofrenijos išsivystymas paveiktame organizme
- Trachėjos bei bronchų pažeidimai
- Plaučių uždegimas + sutrikęs imunitetas prieš infekcijas
- Chroniškas bronchitas
- Naujagimio svorio sumažėjimas jei vartojama nėštumo metu
- Didesnė rizika susirgti retų formų vėžiu

Kanapių dozės įvairovė

Tipiškoje “suktinėje” yra 5-15 mg THC (tetrahidrokanabinolio)

5-24 % THC patenka į kraują

1-2 % pasiekia smegenis

2-3 miligramai – minimalus kiekis “kaifui” pasiekti (apsvaigti)

Palyginimas su alkoholiu

Viename butelyje alaus yra apie 10 gramų gryno alkoholio

(Tai prilygsta 1/2 pintos (0,28 litro) taurei vyno.

Kuris narkotikas, kanapės ar alkoholis, yra stipresnis?

Redaktoriaus pastaba: Paskutiniaisiais metais išvestose kanapių atmainose THC koncentracija gali būti daug didesnė, negu pateikiama šiame pavyzdyje.